

Инструкция по применению препарата **БЕЗОРНИЛ**



› Владелец регистрационного удостоверения:
MAYINGLONG PHARMACEUTICAL GROUP, Co. Ltd (Китай)

› Код АТХ:

Сердечно-сосудистая система (C) > Ангиопротекторы (C05) > Препараты для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения (C05A) > Прочие препараты для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения (C05AX) > Прочие препараты и их комбинации (C05AX03)

› Клинико-фармакологическая группа:

Препарат с вяжущим, подсушивающим и противомикробным действием для местного применения в проктологии

Форма выпуска, состав и упаковка БЕЗОРНИЛ

◆ **мазь д/наружного и ректального применения: 10 г тубы.**

Рег. №: 8494/08/12 от 28.12.2012 - Действующее

Мазь для ректального и наружного применения	1 г	
	искусственный мускус (мускон)	9 мг
	жемчуг	85 мг
	искусственный безоар	11 мг
	янтарь	3.5 мг
	борнеол	38 мг
	цинка карбонат (каламин)	108 мг

10 г - тубы пластиковые (1) в комплекте с 4 наконечниками - пачки картонные.

Описание лекарственного препарата **БЕЗОРНИЛ** создано в 2012 году на основании инструкции, размещенной на официальном сайте Минздрава РБ.

Фармакологическое действие БЕЗОРНИЛ

Комплексный препарат с местным вяжущим, противоотечным, антисептическим, обезболивающим, кровоостанавливающим действием.

Фармакологическое действие обусловлено комбинированным действием биологически активных веществ, входящих в его состав (природных и идентичных природным синтетических компонентов).

Эффективен в отношении наблюдающихся при геморрое болевых ощущений, кровотечений, а также в отношении трещин и зуда в области ануса.

Показания к применению БЕЗОРНИЛ

- геморрой;
- трещины заднего прохода;
- раны анального канала после геморроидэктомии.

Режим дозирования БЕЗОРНИЛ

Ректально. При внутренних геморроидальных узлах и трещинах мазь вводить с помощью пластмассового наконечника в задний проход 2 раза/сут и после каждой дефекации. Курс лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

При наружных геморроидальных узлах, трещинах наносить на участок поражения 2 раза/сут и после каждой дефекации. Дополнительно рекомендуется нанести мазь на стерильную салфетку и нанести ее на область поражения. Курс лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

При лечении ран анального канала после геморроидэктомии мазь вводить в задний проход и на область наружных послеоперационных ран с помощью пластмассового наконечника 2 раза в день и после каждой дефекации. Курс лечения 14 дней. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения определяется лечащим врачом.

Побочное действие БЕЗОРНИЛ

Аллергические реакции.

Противопоказания к применению БЕЗОРНИЛ

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью БЕЗОРНИЛ

При беременности и в период лактации применяют только в случае, если предполагаемая польза для матери превышает риск для плода и ребенка.

Применение у детей БЕЗОРНИЛ

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Применение препарата в детском возрасте не рекомендуется.

Особые указания БЕЗОРНИЛ

В случае, если имеющиеся симптомы заболевания не уменьшаются в процессе лечения или отмечается появление новых необычных ощущений следует обратиться к врачу.

Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены. Применение препарата в детском возрасте не рекомендуется.

Влияние на способность управлять автомобилем или другими механизмами

Препарат не влияет на способность управлять транспортом и работать с движущимися механизмами.

Передозировка БЕЗОРНИЛ

До настоящего времени о случаях передозировки препарата не сообщалось.

Лекарственное взаимодействие БЕЗОРНИЛ

Взаимодействие с другими препаратами не выявлено.

Условия отпуска из аптек БЕЗОРНИЛ

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

Условия и сроки хранения БЕЗОРНИЛ

Препарат хранить при температуре не выше 15°C, в защищенном от света и в недоступном для детей месте.

Срок годности – 3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.