

Постеризан суппозитории ректальные

Латинское название

Posterisan

Форма выпуска

Суппозитории ректальные.

Состав

1 супп. содержит микробные клетки кишечной палочки, убитые фенолом 660 млн ± 25%.

Упаковка

В блистере 5 суппозиториев. В упаковке 2 блистера.

Фармакологическое действие

Постеризан суппозиторий ректальный - препарат для местного применения при заболеваниях аноректальной области.

Содержащиеся в Постеризане антигены клеточных стенок и метаболиты кишечной палочки при контакте со слизистой оболочкой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры.

Препарат стимулирует Т-систему иммунитета, в месте воздействия увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифических факторов иммунитета, уменьшает экссудацию сосудов при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Показания

Препарат назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- Упорное течение геморроя.
- Перианальные дерматиты.
- Анальный и генитальный зуд, особенно при устойчивости к лечению другими лекарственными средствами.
- Анальная трещина.
- Анопапиллит.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фенолу.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение Постеризана при беременности по показаниям.

Способ применения и дозы

Суппозитории применяют по 1 шт. утром и вечером, а также после каждого акта дефекации.

Возможно комбинированное использование мази (Постеризан мазь туба 25 г кор. 1 Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ) и суппозиториев.

Продолжительность курса лечения составляет 2-3 недели.

Особые указания

В качестве консерванта в препарате используется фенол.

Лекарственное взаимодействие

Лекарственное взаимодействие препарата Постеризан не описано.



Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Постеризан не сообщалось.

Условия хранения

- Препарат следует хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C; не замораживать.
- Хранить в местах недоступных для детей.
- Не использовать после истечения срока годности.

Срок годности

3 года.